

# Femmes et PrEP : pourquoi ce désamour ? Résultats d'une étude au Mali, Maroc et Maurice

Thématique : Droit à la santé sexuelle et reproductive

Rime Barrakad<sup>1</sup>, Amal Ben Moussa<sup>1</sup>, Luis Sagaon-Teyssier<sup>2</sup>, Niloufer Khodabocus<sup>3</sup>, Annette Ebsen Treebhoobun<sup>3</sup>, Fodié Diallo<sup>4</sup>, Daniela Rojas Castro<sup>5</sup>, Rosemary Delabre<sup>5</sup>, Lahoucine Ouarsas<sup>1</sup>, Mehdi Karkouri<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Association De Lutte Contre Le Sida (ALCS) - Casablanca (Maroc), <sup>2</sup>Aix Marseille Univ, Inserm, Ird, Sesstim, Sciences Économiques & Sociales De La Santé & Traitement De L'information Médicale, Isspam - Marseille (France), <sup>3</sup>Prévention Information Lutte Contre Le Sida (PILS) - Port Louis (Maurice), <sup>4</sup>ARCAD Santé PLUS - Bamako (Mali), <sup>5</sup>Laboratoire De Recherche Communautaire, Coalition Plus - Pantin (France)

## Objectifs

Les femmes appartenant aux populations vulnérables enregistrent un taux élevé d'incidence et de prévalence d'infection par le VIH. La prophylaxie préexposition (PrEP) peut être une bonne alternative de prévention pour ces femmes. Or, partout dans le monde, le recours des femmes à la PrEP reste faible. Cette étude, menée à Maurice, au Mali et au Maroc, vise à évaluer l'état de connaissances des femmes sur la PrEP et à comprendre les intentions et les obstacles à son utilisation.

## Matériels et Méthodes

Après une recherche formative, des enquêtes en face à face ont été menées auprès de travailleuses de sexe (TS) au Mali et au Maroc et de femmes transgenres (TG) et partenaires de personnes s'injectant des drogues (PPID) à Maurice. Les participantes ont été recrutées en utilisant la méthodologie d'échantillonnage déterminé selon les répondants (RDS) et ont répondu à un questionnaire portant sur les données sociodémographiques, la perception du risque, la connaissance et l'intention d'utiliser la PrEP ainsi que les barrières à son utilisation. Les données collectées sur Voxco ont été traitées par le logiciel RDS Analyst.

## Résultats

Au total, 1003 femmes ont été interrogées, 260 TS étaient de Bamako (Mali), 257 de Agadir et 248 de Rabat (Maroc) et 179 PPID et 59 TG étaient de Port Louis (Maurice). L'étude a mis en évidence les principales barrières à la PrEP, notamment la non-connaissance de ce moyen de prévention, seulement 13% (IC95% : 7-19) des TS au Mali ont entendu parler de la PrEP, 4% (IC95% : 1-7) à Rabat et 15% (IC95% : 9-21) à Agadir au Maroc, 20% (IC95% : 11-29) des PPID et 54% (IC95% : 35-74) des TG à Maurice. 43% (IC95% : 35-51) des TS au Mali, 51% (IC95% : 39- 63) des PPID et 57% (IC95% : 38-74) des TG ont déclaré craindre les effets

secondaires de la PrEP. Pareil pour la prise quotidienne du médicament qui n'est pas appréciée chez 36% (IC95% : 28-44) des TS au Mali. D'autres barrières d'ordre structurel ont été identifiées particulièrement la stigmatisation perçue par 34% (IC95% : 22-46) des PPID et la peur des lois coercitives chez 88% (IC95% : 79-97) des TG. La plupart des femmes ont déclaré avoir l'intention d'utiliser la PrEP, 84% (IC95% : 79-90) des TS au Mali, 78% (IC95% : 71-84) à Rabat, 76% (IC95% : 69-84) à Agadir, 71% (IC95% : 60-82) des PPID et 50% (IC95% : 31-70) des TG à Maurice.

## **Conclusion**

Cette étude montre l'importance d'un service PrEP communautaire pour ces populations cibles. Toutefois, son adhérence est impactée par des facteurs de vulnérabilité notamment des facteurs socioculturels et économiques. L'adaptation des services aux besoins des femmes, dans leur diversité, permettrait sans nul doute d'améliorer leur recours à la PrEP.

## **Conflits d'intérêts**

Aucun conflit

## **Mots clés**

Femmes ; PrEP ; Recherche Communautaire ; TS ; PPID ; TG ; RDS

## **E-mail des co-auteurs**

Rime Barrakad: [r.barrakad@alcs.ma](mailto:r.barrakad@alcs.ma)

Amal Ben moussa: [a.benmoussa@alcs.ma](mailto:a.benmoussa@alcs.ma)

Luis Sagaon-Teyssier: [luis.sagaon-teyssier@ird.fr](mailto:luis.sagaon-teyssier@ird.fr) ; [luis.sagaon-teyssier@inserm.fr](mailto:luis.sagaon-teyssier@inserm.fr)

Niloufer Khodabocus: [n.khodabocus@pils.mu](mailto:n.khodabocus@pils.mu)

Annette Ebsen Treebhoobun: [a.treebhoobun@pils.mu](mailto:a.treebhoobun@pils.mu)

Fodié Diallo: [fdiallo@arcadsanteplus.org](mailto:fdiallo@arcadsanteplus.org)

Daniela Rojas Castro: [drojascastro@coalitionplus.org](mailto:drojascastro@coalitionplus.org)

Rosemary Delabre: [rdelabre@coalitionplus.org](mailto:rdelabre@coalitionplus.org)

Lahoucine Ouarsas: [l.ouarsas@alcs.ma](mailto:l.ouarsas@alcs.ma)

Mehdi Karkouri: [m.karkouri@alcs.ma](mailto:m.karkouri@alcs.ma)